

Meningitisvaccins

WELKE ZIJN ER?

#wereldmeningitisdag #hetzaljemaargebeuren
#worldmeningitisday #aftermeningitis



Vaccinatie kan meningitis & sepsis grotendeels voorkomen

VACCINS TEGEN MENINGITIS EN SEPSIS

Er zijn verschillende vaccins die beschermen tegen vormen van meningitis en sepsis en encefalitis (hersenenontsteking).

De meeste van deze vaccins maken deel uit van het RVP = rijksvaccinatieprogramma.

- **Mazelen** | vanaf 1976 in RVP
- **BMR** (bof, mazelen en rode hond = rubella) | encefalitis en meningitis kunnen complicaties zijn van mazelen en bof, vanaf 1976 in RVP
- **Hib** (*Haemophilus influenzae* type b) | ook veroorzaker van epiglottitis, vanaf 1982 in RVP
- **Meningokokken** (*Neisseria meningitidis*) **ACWY** | vanaf 2018 in RVP, vervanging van men C vanaf 2002
- **Pneumokokken** (*Streptococcus pneumoniae*) | 10-valent vanaf 2006 in RVP
- **Meningokokken B** | niet in RVP.

MENINGOKOKKEN B

Het vaccin tegen meningokokken B draagt niet bij aan groepsimmunitet tegen deze bacterie. Met inenten verminder je het risico op ziek worden van de gevaccineerde met \pm 60-80%. De omgeving bescherm je niet. Jaarlijks zijn er rond de 80 ziektegevallen door B, waarvan het merendeel jonger dan 5 jaar is.

VACCINATIESCHEMA MENINGITIS-VACCINS

Leeftijd	6-9w	3m	4m	11m	14m	9j	14j
Hib	x	x	x	x			
Pneumo	x		x	x			
Men ACWY						x	x
BMR					x	x	
Men B*	2-5 mnd: 4; 3-23 mnd: 3; vanaf 2 jr 2 vaccinaties						

*Zelf regelen en bekostigen via huisarts/vaccinatiecentrum

VACCINEREN, WAAROM NIET?

Meningitisvaccins voorkomen veel leed en verdriet. Het ongemak van tijdelijke reacties weegt niet op tegen de vaak levenslange gevolgen van meningitis/sepsis.

BESCHERM JE OMGEVING

Een hoge vaccinatiegraad zorgt ook voor bescherming van niet gevaccineerde mensen, dit heet groepsimmunitet. Een vaccinatiegraad van 95% is nodig om groepsimmunitet te waarborgen.

PNEUMOKOKKEN


Het pneumokokkenvaccin voor kinderen beschermt tegen de 10 meest voorkomende typen gedurende minimaal 5 jaar. Een vaccin tegen 23 typen werkt 3-5 jaar en wordt meestal op indicatie aan ouderen gegeven.

De overheid beslist in 2019 of alle ouderen vanaf 60 jaar het 23 typen vaccin standaard gaan krijgen.

MENINGOKOKKEN ACWY

Een vaccin tegen meningokokken ACWY wordt sinds mei 2018 aan kinderen van 14 maanden gegeven, in plaats van het meningokokken C vaccin. Dit als reactie op de toename van het aantal ziektegevallen door W vanaf 2015. Ook 14-jarigen krijgen dit vaccin en in 2019 alle 15-18 jarigen. Meningokokken W komt vooral voor bij jonge kinderen, tieners en ouderen. In 2018 waren er meer dan 100 gevallen.

B, C, W EN Y ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE MENINGOKOKKEN



Bron: referentielaboratorium voor Bacteriële meningitis; AMC ; Amsterdam

Meer informatie: www.meningitis-stichting.nl/informatie/vaccins
info, voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging